

HÉRISSON D'EUROPE

Mammifères



Petit mammifère pesant de 0,5 à 1,5kg, le Hérisson d'Europe est facilement identifiable à son dos recouvert de piquants. Ces derniers, constitués de poils agglutinés, sont de couleur jaunâtre à la base ainsi qu'à l'extrémité et plus foncés au milieu. Chaque hérisson adulte en possède environ 5000 à 6000 qui sont renouvelés tous les 18 mois.

QUI EST-IL ?

Nom latin : *Erinaceus europaeus*

Ordre : *Erinaceomorpha*

Famille : *Erinaceidae*

Poids : 0,5 à 1,5 kg (poids inférieur de 30% à la fin de l'hibernation)

Taille : 23 à 30 cm

Distribution : le Hérisson d'Europe est présent partout en France, y compris en Corse. Il est absent de l'île d'Yeu.

Habitat : en ville ou à la campagne, il s'installe partout où il peut trouver un abri (haie, forêt, buisson, tas de bois...) et de la nourriture (lisière, tas de compost, tas de feuilles...).

Régime alimentaire : principalement insectivore, il chasse dès le crépuscule sauterelles, criquets, hannetons, chenilles, araignées, escargots, limaces, etc. Plus rarement : serpents, lézards, rongeurs, batraciens, oiseaux nichant au sol, œufs, végétaux (fruits, baies).

Il se sert de son odorat et de son ouïe pour chasser, et fait beaucoup de bruit en mastiquant sa nourriture.

Cycle de vie :

Hibernation

A l'approche de l'hiver, le Hérisson d'Europe stocke la nourriture sous forme de graisse pour pouvoir hiberner jusqu'au printemps. **Il hiberne quand les températures sont inférieures à 10°C**, dans un endroit à l'abri

du froid et du vent (sous un tas de bois, de feuilles mortes, ronciers, au fond d'une grange...). Sa température, habituellement de 35,4°C, chute l'hiver à 4°C.

Cette phase d'hibernation est entrecoupée de phases de réveils, plus ou moins fréquentes et plus ou moins longues. Le réveil définitif a lieu en avril.

Reproduction

Le mâle et la femelle se rencontrent au printemps à la sortie de l'hibernation et se séparent après l'accouplement. La saison de reproduction se prolonge jusqu'en septembre.

Élevage (1 à 2 portées par an, 4 à 5 petits par portée)

La gestation dure une trentaine de jours. Les petits naissent aveugles, roses et nus. Les femelles s'en occupent seules et les allaitent durant 7 à 8 semaines. A 11 jours, les petits se mettent en boule. A 22 jours, ils sortent du nid. Le jeune hérisson devient adulte au printemps suivant.

QUE DIT LA LOI ?

Les Hérissons d'Europe et leur habitat sont protégés par l'article L.411-1 du code de l'environnement et par l'Arrêté du 23 avril 2007 ainsi que son arrêté modificatif du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés en France.

Tout acte de destruction des individus ou de leur site de reproduction est passible de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, selon l'art. 415-3.

Prédateurs naturels : la Buse variable, le Grand-duc d'Europe, la Chouette hulotte, le Blaireau européen, le Renard roux...

Menaces : routes, piscines, feux de feuilles, granulés anti-limaces ou anti-fourmis, tondeuses, fourches, filets de protection, cavités pièges (boîte de conserve vide, tuyauterie non bouchée...), chiens domestiques...

Parasites : puces du hérisson, tiques, vers (intestinaux, pulmonaires).



Hérisson d'Europe © LPO Aquitaine

QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES ?

Il arrive qu'un hérisson soit porteur de tiques ou de puces...

Un hérisson, même en bonne santé, peut avoir des tiques. Tous les mammifères sont porteurs d'ectoparasites et ne sont pas pour autant en détresse. Les tiques ou les puces présentes ne changeront pas d'hôtes et n'infecteront pas les chiens et chats.

Il arrive qu'un hérisson se noie dans une piscine ou une mare...

Le hérisson est un bon nageur, mais il risque de mourir d'épuisement quand il ne peut pas sortir des basins aux parois abruptes et lisses.

Il arrive qu'un hérisson soit délogé de son nid...

En nettoyant son jardin, il arrive de trouver, de déranger, voire détruire, un nid de hérisson. Vous pouvez l'aider à construire ou reconstruire son nid.

Il arrive qu'un hérisson soit victime du jardinage...

Les pesticides, insecticides et raticides peuvent empoisonner directement ou indirectement le hérisson. Au printemps ou à l'automne, la première tonte ou les brûlis de feuilles peuvent le piéger.

La tonte au robot tondeuse la nuit est particulièrement dangereuse pour le hérisson. En effet, les tondeuses ne font, pour la plupart, pas la différence entre ces animaux nocturnes et une motte de terre et des blessures parfois mortelles sont occasionnées.

Il arrive qu'un hérisson mange les œufs de mes poules...

En allant chercher les œufs de vos poules, il est rare, mais possible, de ne trouver que les coquilles vides, sur place, avec quelques traces de dents rapprochées. Il peut aussi s'agir d'un vol de fouine, de putois ou de belette...

LES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE COHABITATION

Le hérisson est une espèce sauvage qui cohabite facilement avec les Hommes. La présence de corridors écologiques et de passages dans les clôtures ou murets lui permettent de se déplacer facilement à la recherche de nourriture.

Que faire si je croise un hérisson ?

Le hérisson est un animal nocturne que l'on peut toutefois rencontrer en pleine journée.

La nuit, vous pouvez le voir divaguer et chasser sur son territoire. En journée le hérisson reste généralement caché, mais il arrive parfois qu'il soit actif et se déplace vers un autre site s'il a été dérangé. Dans les deux cas, il est important de prendre le temps de l'observer à distance (sans être vu ni entendu par l'animal) pour s'assurer de ne pas ramasser un individu en bonne santé. **En cas de doute, n'hésitez pas à appeler un centre de sauvegarde qui vous conseillera.**

Ramasser un hérisson sans qu'il ne soit en détresse peut avoir des conséquences dramatiques, notamment s'il s'agit d'une femelle allaitante, condamnant ainsi la portée. Pour vous aider, voici quelques conseils à suivre.

Prenez le temps d'observer à distance

Au printemps, en été et à l'automne

Si vous rencontrez un hérisson en pleine nuit dans votre jardin, dans un espace public ou au bord d'une route, s'il est actif, il est très certainement en bonne santé. Laissez-le poursuivre son chemin.

Si vous découvrez un hérisson immobile en pleine journée, approchez-vous doucement afin de l'observer de plus près. S'il se met en boule ou pousse des grognements à votre approche, laissez-le tranquille et revenez une heure plus tard. S'il n'a pas bougé, la situation peut être anormale. Si vous constatez qu'il est blessé (boiterie, plaie...), récupérez le hérisson et contactez un centre de soin. **S'il est infesté par des mouches, des œufs ou des larves, contactez un centre de soin en urgence.**

En hiver

Si vous trouvez un hérisson immobile dans votre garage, dans un pot de fleurs, dans le compost, ou sous un tas de bois, ne le dérangez pas : il hiberne.

Si vous rencontrez un hérisson actif à l'extérieur : lorsque les températures sont plus clémentes, il peut sortir de son gîte à la recherche de nourriture, et n'est donc pas forcément en détresse. Il est important de bien l'observer avant d'envisager d'agir. **Ne vous précipitez pas, cela vous évitera de ramasser un hérisson en bonne santé.**

En cas de situation anormale avérée

Préparez un carton troué avec une litière de journaux. Attrapez et installez-le délicatement à l'intérieur. Gardez-le dans une pièce au calme. **Ne pas nourrir ni hydrater l'animal, cela peut aggraver son état.**

Puis contactez rapidement un centre de sauvegarde de la faune sauvage habilité : <https://www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/centres-de-sauvegarde>

Des tiques sont visibles sur le hérisson

La présence de tiques sur un hérisson n'est pas forcément signe de détresse. Il est important de vérifier que l'animal a un comportement "normal" et qu'il n'est pas prostré ou apathique. S'il se déplace normalement et ne montre pas de signes évidents de difficultés, il ne faut pas intervenir.

Ramassage des jeunes hérissons

Avant de les ramasser, assurez-vous qu'ils sont réellement en détresse. Un jeune en bonne santé aura de plus grandes chances de survie s'il est élevé par sa mère que s'il est rapatrié vers un centre de soins.

En cas de dérangement du nid, remplacez les individus dans le nid reconstitué et prenez le temps de vous assurer que la femelle revient s'occuper des jeunes. Pour plus d'information, consultez la fiche **MFS Ramassage jeunes**.

Si vous trouvez des **jeunes hérissons aux yeux fermés** hors du nid, ramassez-les, placez-les dans un carton avec une bouillotte et un tissu polaire et contactez rapidement un centre de sauvegarde habilité.

Si vous trouvez des **jeunes aux yeux ouverts et avec des piquants** se baladant seuls, attendez de voir si un adulte revient. S'il ne revient pas, vérifiez si le reste de la portée n'est pas dans les environs en difficulté, puis ramassez le jeune et placez-le dans un carton et contactez un centre de soins.

Accueillir le hérisson chez soi

La LPO préconise aux particuliers de ne pas nourrir le Hérisson d'Europe : le lait et du pain lui donnent des diarrhées mortelles, les croquettes pour chats peuvent entraîner des carences alimentaires, etc. Le nourrir peut aussi le rendre dépendant de l'Homme et inapte à trouver lui-même sa nourriture. Si vous avez des gamelles pour chats en extérieur, mettez-les en hauteur pour les rendre inaccessibles aux hérissons.

Pour éviter les noyades dans les piscines, mares, etc. Fixez une planche de bois rugueuse ou un grillage, à demi-immérgé, de manière inclinée. Le hérisson pourra se hisser hors de l'eau.


Les hérissons sont des auxiliaires des cultures, ils mangent les limaces et autres invertébrés et sont donc très sensibles aux insecticides. **Retrouvez les alternatives aux anti-limaces chimiques dans la fiche MFS limaces.**

Si vous devez tondre ou faucher, partez du centre vers l'extérieur pour permettre à la faune sauvage d'aller s'abriter, après vous être assuré de l'absence de hérisson dans votre jardin. Faites particulièrement attention aux pieds des haies ! **Ne faites pas fonctionner vos tondeuses automatiques la nuit** : elles mutilent grièvement ces animaux nocturnes lorsqu'elles les croisent.

Pour éviter qu'un hérisson ne vienne manger les œufs de vos poules, condamnez l'accès du poulailler au hérisson tout en maintenant l'accès pour vos poules (qui peuvent sauter ou voler) : enlevez la rampe d'accès, surélevez les nids, fermez le poulailler le soir ou récupérez les œufs tous les soirs.

La présence de **corridors écologiques et de passages dans les clôtures ou murets** facilite ses déplacements à la recherche de nourriture. Pour favoriser la présence de hérissons chez vous, vous pouvez aménager des passages entre votre jardin, la voie publique et les jardins des voisins.

QUE FAIRE LORSQUE JE DÉCOUVRE UN NOUVEAU-NÉ, UN JEUNE OU UN IMMATURE ?



CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LPO, Fonderies Royales, 17305 Rochefort Cedex - lpo@lpo.fr - 05 46 82 12 34

Retrouvez toutes nos fiches MFS sur <https://lpo.fr/mediation>

Ce document a été édité par la LPO France
 Rédaction par Q de Guilhemier, F Blaevonet, N Dupuy (LPO)
 Relecture par AL Dugué, N Macaire, L Autret, N Furon, S Thibaut-Lecornu, B Viseux (LPO)
 Photo (première page) © Michel Wöhrel



**Agir pour
la biodiversité**